

Задача 1.0. Розглянемо площину F , що проходить через точку $P(2,0,1)$ і натягнута на вектори $(1,1,2)$ і $(0,4,0)$. Запишіть параметричне рівняння (радіус-вектор) площини F . Перевірте регулярність параметрично заданої площини F .

Розв'язання.

$$\begin{aligned}\vec{x} &= \vec{x}_P + u^1 \vec{e}_1 + u^2 \vec{e}_2 \\ \vec{x} &= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + u^1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + u^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + u^1 \\ u^1 + 4u^2 \\ 1 + 2u^1 \end{pmatrix}, \quad (u^1, u^2) \in \mathbb{R}^2 \\ \left(\frac{\partial \vec{f}}{\partial u^1} \frac{\partial \vec{f}}{\partial u^2} \right) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{Rank} \left(\frac{\partial \vec{f}}{\partial u^1} \frac{\partial \vec{f}}{\partial u^2} \right) = \text{Rank} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \equiv 2\end{aligned}$$

Відповідь: Параметрично задана площина F є регулярною поверхнею

***Задача 2.1.** Проаналізуйте регулярність циліндричної поверхні F з радіус-вектором $\vec{x} = \vec{\xi}(u^1) + u^2 \cdot \vec{a}$, утвореної прямими з напрямним вектором $\vec{a}$, що проходять через точки кривої γ з радіус-вектором $\vec{x} = \vec{\xi}(u^1)$.

Розв'язання:

$$\vec{f}(u^1, u^2) = \vec{\xi}(u^1) + u^2 \cdot \vec{a}, \quad \frac{\partial \vec{f}}{\partial u^1} = \frac{d\vec{\xi}}{du^1}, \quad \frac{\partial \vec{f}}{\partial u^2} = \vec{a}, \quad \left[\frac{\partial \vec{f}}{\partial u^1}, \frac{\partial \vec{f}}{\partial u^2} \right] = \left[\frac{d\vec{\xi}}{du^1}, \vec{a} \right]$$

Особливі точки на параметрично заданій циліндричній поверхні,

$$\left[\frac{\partial \vec{f}}{\partial u^1}, \frac{\partial \vec{f}}{\partial u^2} \right] = \vec{0},$$

виникають або якщо $\frac{d\vec{\xi}}{du^1} = \vec{0}$, тобто якщо базова крива γ містить сингулярну

точку (і тоді уся твірна пряма циліндра, яка проходить через особливу точку базової кривої, буде особливим ребром на циліндрі), або якщо в якійсь точці на базовій кривій γ її дотичний вектор є колінеарним напрямному вектору $\vec{a}$ твірних прямих циліндра.

***Задача 2.2.** Проаналізуйте регулярність конічної поверхні F з радіус-вектором $\vec{x} = u^2 \cdot \vec{a}(u^1)$, утвореної прямими, що проходять через точку $O(0,0,0)$ і точки кривої з радіус-вектором $\vec{x} = \vec{a}(u^1)$.

Розв'язання:

$$\vec{f}(u^1, u^2) = u^2 \cdot \vec{a}(u^1), \quad \frac{\partial \vec{f}}{\partial u^1} = u^2 \cdot \frac{d\vec{a}}{du^1}, \quad \frac{\partial \vec{f}}{\partial u^2} = \vec{a}, \quad \left[\frac{\partial \vec{f}}{\partial u^1}, \frac{\partial \vec{f}}{\partial u^2} \right] = u^2 \cdot \left[\frac{d\vec{a}}{du^1}, \vec{a} \right]$$

Особливі точки на параметрично заданій конічній поверхні,

$$\left[\frac{\partial \vec{f}}{\partial u^1}, \frac{\partial \vec{f}}{\partial u^2} \right] = \vec{0},$$

виникають або якщо $u^2 = 0$, що відповідає вершині конуса, або якщо в якійсь точці на базовій кривій γ виконано $\left[\frac{d\vec{a}}{du^1}, \vec{a} \right] = \vec{0}$ і тоді уся твірна пряма конуса, яка проходить через відповідну точку базової кривої, буде особливим ребром на конусі.

***Задача 2.3.** Проаналізуйте регулярність торсової поверхні F з радіус-вектором $\vec{x} = \vec{\xi}(u^1) + u^2 \cdot \vec{\tau}(u^1)$, утвореної дотичними прямими кривої γ з радіус-вектором $\vec{x} = \vec{\xi}(u^1)$.

Розв'язання: $\vec{f}(u^1, u^2) = \vec{\xi}(u^1) + u^2 \cdot \vec{\tau}(u^1)$,

$$\frac{\partial \vec{f}}{\partial u^1} = \vec{\tau} + u^2 \cdot k \vec{\nu}, \quad \frac{\partial \vec{f}}{\partial u^2} = \vec{\tau}, \quad \left[\frac{\partial \vec{f}}{\partial u^1}, \frac{\partial \vec{f}}{\partial u^2} \right] = u^2 \cdot k[\vec{\tau}, \vec{\nu}]$$

Особливі точки на параметрично заданій торсовій поверхні,

$$\left[\frac{\partial \vec{f}}{\partial u^1}, \frac{\partial \vec{f}}{\partial u^2} \right] = \vec{0},$$

виникають або якщо $u^2 = 0$, що відповідає точкам початкової кривої γ , яку є особливим ребром на торсовій поверхні, або якщо в якійсь точці на базовій кривій γ кривина $k=0$, і тоді уся твірна пряма торсової поверхні, яка проходить через відповідну точку перегину базової кривої γ , буде особливим ребром на торсовій поверхні.

****Задача 2.4.** Чи може циліндрична поверхня бути площиною?

- 1) Чи може циліндрична поверхня бути площиною?
- 2) Чи може конічна поверхня бути площиною?
- 3) Чи може торсова поверхня бути площиною?

Відповіді:

- 1) Так, якщо базова крива є плоскою, а спільний напрямок прямолінійних твірних також спрямований в тій же площині, де розташована базова крива.
- 2) Так, якщо базова крива є плоскою, а вершина O конуса лежить в тій же площині, де розташована базова крива.
- 3) Так, якщо базова крива є плоскою.

Задача 3.1.2. Розглянемо горизонтальну пряму $x^3=r>0$ в площині x^1x^3 . Яка поверхня утворюється в $\mathbb{R}^3$ обертанням вказаної прямої навколо осі x^3 ? Запишіть радіус-вектор цієї поверхні і перевірте її регулярність.

Розв'язання. Пряма γ задається параметрично


$$\begin{cases} x^1 = t \\ x^2 = 0 \\ x^3 = r \end{cases}, \quad -\infty < t < \infty$$

Відповідна поверхня обертання F (навколо осі x^3) задається радіус-вектором

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \cos \varphi \\ t \sin \varphi \\ r \end{pmatrix},$$

тобто,

$$\begin{cases} x^1 = t \cos \varphi \\ x^2 = t \sin \varphi, \\ x^3 = r \end{cases}, \quad -\infty < t < \infty, \quad 0 < \varphi < 2\pi.$$



Вектор-функція

$$\vec{f}(t, \varphi) = \begin{pmatrix} t \cos \varphi \\ t \sin \varphi \\ r \end{pmatrix}$$

є неперервно диференційовною. Перевіримо умову регулярності:

$$\text{Rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{f}}{\partial t} & \frac{\partial \vec{f}}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = \text{Rank} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -t \sin \varphi \\ \sin \varphi & t \cos \varphi \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

В точках з $t \neq 0$ маємо $\text{Rank } J = 2$. В точках з $t = 0$ маємо $\text{Rank } J = 1$.

Отже, задана поверхня обертання F – горизонтальна площина – має єдину особливу точку $P(0,0,r)$, що відповідає значенню $t=0$. В усіх інших точках умови регулярності будуть виконані, тому задана поверхня F з виколотою точкою P буде регулярною параметрично заданою поверхнею.

$$\text{Відповідь: } \begin{cases} x^1 = t \cos \varphi \\ x^2 = t \sin \varphi, \\ x^3 = r \end{cases}, \quad -\infty < t < \infty, \quad 0 < \varphi < 2\pi.$$

Задача 3.2. Розглянемо ланцюгову лінію

$$\begin{cases} x^1 = r \cosh t \\ x^3 = t \end{cases}$$

Яка поверхня утворюється в $\mathbb{R}^3$ обертанням цієї лінії навколо осі x^3 ?



Запишіть радіус-вектор цієї поверхні і перевірте її регулярність.

Розв'язання. Крива γ задається параметрично

$$\begin{cases} x^1 = r \cosh t \\ x^2 = 0 \\ x^3 = t \end{cases}, \quad -\infty < t < \infty$$

Відповідна поверхня обертання F (навколо осі x^3) задається радіус-вектором

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} r \cosh t \cos \varphi \\ r \cosh t \sin \varphi \\ t \end{pmatrix}, \quad \text{тобто,} \quad \begin{cases} x^1 = r \cosh t \cos \varphi \\ x^2 = r \cosh t \sin \varphi \\ x^3 = t \end{cases}$$
$$-\infty < t < \infty, \quad 0 < \varphi < 2\pi.$$



Вектор-функція

$$\vec{f}(t, \varphi) = \begin{pmatrix} r \cosh t \cos \varphi \\ r \cosh t \sin \varphi \\ t \end{pmatrix}$$

є неперервно диференційовною. Перевіримо умову регулярності:

$$\text{Rank} \left(\begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{f}}{\partial t} & \frac{\partial \vec{f}}{\partial \varphi} \end{pmatrix} \right) = \text{Rank} \begin{pmatrix} r \sinh t \cos \varphi & -r \cosh t \sin \varphi \\ r \sinh t \sin \varphi & r \cosh t \cos \varphi \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \equiv 2.$$

Отже, задана поверхня обертання F є регулярною параметрично заданою поверхнею. Вона називається *катеноїд*.

$$\text{Відповідь: } \begin{cases} x^1 = r \cosh t \cos \varphi \\ x^2 = r \cosh t \sin \varphi, & -\infty < t < \infty, \quad 0 < \varphi < 2\pi. \\ x^3 = t \end{cases}$$

Задача 3.3. Розглянемо трактрису $\begin{cases} x^1 = \frac{1}{\cosh t} \\ x^3 = t - \tanh t \end{cases}$


Яка поверхня утворюється в $\mathbb{R}^3$ обертанням цієї лінії навколо осі x^3 ?
Запишіть радіус-вектор цієї поверхні і перевірте її регулярність.

Розв'язання. Крива γ задається параметрично

$$\begin{cases} x^1 = \frac{1}{\cosh t} \\ x^2 = 0 \\ x^3 = t - \tanh t \end{cases}, \quad -\infty < t < \infty$$

Відповідна поверхня обертання F (навколо осі x^3) задається радіус-вектором

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\cosh t} \cos \varphi \\ \frac{1}{\cosh t} \sin \varphi \\ t - \tanh t \end{pmatrix}, \quad \text{тобто,} \quad \begin{cases} x^1 = \frac{1}{\cosh t} \cos \varphi \\ x^2 = \frac{1}{\cosh t} \sin \varphi \\ x^3 = t - \tanh t \end{cases}, \quad \begin{matrix} -\infty < t < \infty \\ 0 < \varphi < 2\pi \end{matrix}.$$



$$\text{Вектор-функція } \vec{f}(t, \varphi) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\cosh t} \cos \varphi \\ \frac{1}{\cosh t} \sin \varphi \\ t - \tanh t \end{pmatrix}$$


є неперервно диференційовною. Перевіримо умову регулярності:

$$\text{Rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{f}}{\partial t} & \frac{\partial \vec{f}}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = \text{Rank} \begin{pmatrix} -\frac{\sinh t}{\cosh^2 t} \cos \varphi & -\frac{1}{\cosh t} \sin \varphi \\ -\frac{\sinh t}{\cosh^2 t} \sin \varphi & \frac{1}{\cosh t} \cos \varphi \\ \tanh^2 t & 0 \end{pmatrix}$$

Якщо $t \neq 0$, то $\text{Rank } J = 2$ і умова регулярності виконана.

Якщо ж $t = 0$, то $\text{Rank } J < 2$ і умова регулярності порушена. Отже, задана поверхня обертання F має особливі точки (які утворюють ребро поверхні) і тому не є регулярною параметрично заданою поверхнею.

Поверхня називається *псевдосфера* або *поверхня Бельтрамі*



$$\text{Відповідь: } \begin{cases} x^1 = \frac{1}{\cosh t} \cos \varphi \\ x^2 = \frac{1}{\cosh t} \sin \varphi, \\ x^3 = t - \tanh t \end{cases} \quad \begin{matrix} -\infty < t < \infty \\ 0 < \varphi < 2\pi \end{matrix}$$

***Задача 3.4.** Розглянемо поверхню в $\mathbb{R}^3$, утворену обертанням кривої γ

$$\begin{cases} x^1 = r(t) \\ x^3 = h(t) \end{cases}$$

навколо осі x^3 . Запишіть радіус-вектор цієї поверхні, перевірте її регулярність та зробіть висновок про те, коли на поверхні обертання можуть виникнути особливі точки (де порушується умова регулярності).

Розв'язання. Поверхня обертання задається у вигляді

$$\begin{cases} x^1 = r(t) \cos \varphi \\ x^2 = r(t) \sin \varphi, \quad a < t < b, \quad \alpha < \varphi < \beta. \\ x^3 = h(t) \end{cases}$$

Умова регулярності:

$$\text{Rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial t} & \frac{\partial x^1}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial x^2}{\partial t} & \frac{\partial x^2}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial x^3}{\partial t} & \frac{\partial x^3}{\partial \varphi} \end{pmatrix} \equiv 2.$$

$$\text{Маємо: } J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial t} & \frac{\partial x^1}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial x^2}{\partial t} & \frac{\partial x^2}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial x^3}{\partial t} & \frac{\partial x^3}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{dr}{dt} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \frac{dr}{dt} \sin \varphi & r \cos \varphi \\ \frac{dh}{dt} & 0 \end{pmatrix}$$

Якщо $r(t_0)=0$, тобто, коли меридіан перетинає вісь обертання, $\text{Rank } J < 2$. Отже, при $t=t_0$ умова регулярності порушена, отримаємо особливу точку V на параметризованій поверхні обертання. Координати цієї особливої точки як точки в просторі $V(0, 0, h(t_0))$.

Якщо $\frac{dr}{dt}(t_0)=0$, $\frac{dh}{dt}(t_0)=0$, тобто, коли на меридіані є особлива точка, то тоді $\text{Rank } J < 2$. Отже, при $t=t_0$ умова регулярності порушена, також отримаємо особливу точку V на параметризованій поверхні обертання. Координати цієї особливої точки як точки в просторі $V(r(t_0)\cos\varphi, r(t_0)\sin\varphi, h(t_0))$ залежать від кута обертання φ . Таким чином, на поверхні обертання виникає коло особливих точок поверхні, утворене обертанням особливої точки меридіана.

Якщо меридіан не перетинає вісь обертання і не має особливих точок, поверхня обертання буде регулярною параметрично заданою поверхнею.

Задача 4. Проаналізуйте регулярність наступних неявно заданих поверхонь та, якщо є, вкажіть особливі (сингулярні) точки, де порушуються умови регулярності:

1) площина: $a_1 x^1 + a_2 x^2 + a_3 x^3 = a_0$

2) еліпсоїд: $a_1 (x^1)^2 + a_2 (x^2)^2 + a_3 (x^3)^2 = 1, \quad a_1 > 0, a_2 > 0, a_3 > 0$

3) гіперболоїд: $a_1 (x^1)^2 + a_2 (x^2)^2 - a_3 (x^3)^2 = \pm 1, \quad a_1 > 0, a_2 > 0, a_3 > 0$

4) параболоїд: $x^3 = a_1 (x^1)^2 \pm a_2 (x^2)^2, \quad a_1 > 0, a_2 > 0$

5) лінійчата поверхня: $\Phi\left(\frac{x^1}{x^3}, \frac{x^2}{x^3}\right) = 0$

6) циліндрична поверхня: $\Phi(x^1, x^2) = 0$

7) поверхня обертання: $\Phi((x^1)^2 + (x^2)^2, x^3) = 0$

8) кубічна поверхня: $x^1 x^2 x^3 = a_0$

3) Функція $\Phi(x^1, x^2, x^3) = a_1 (x^1)^2 + a_2 (x^2)^2 - a_3 (x^3)^2 \mp 1 \in C^\infty$ -гладкою.

Запишемо систему рівнянь для знаходження особливих точок поверхні:

$$\begin{cases} \Phi = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x^1} = 0, \frac{\partial \Phi}{\partial x^2} = 0, \frac{\partial \Phi}{\partial x^3} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 (x^1)^2 + a_2 (x^2)^2 - a_3 (x^3)^2 \mp 1 = 0 \\ 2a_1 x^1 = 0, 2a_2 x^2 = 0, 2a_3 x^3 = 0 \end{cases}$$

Система не має розв'язків. Значить, на гіперболоїді F немає особливих точок. Це означає, що гіперболоїд F є регулярною неявно заданою поверхнею.

4) Функція $\Phi(x^1, x^2, x^3) = a_1 (x^1)^2 \pm a_2 (x^2)^2 - x^3 \in C^\infty$ -гладкою.

Запишемо систему рівнянь для знаходження особливих точок поверхні:

$$\begin{cases} \Phi = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x^1} = 0, \frac{\partial \Phi}{\partial x^2} = 0, \frac{\partial \Phi}{\partial x^3} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 (x^1)^2 \pm a_2 (x^2)^2 - x^3 = 0 \\ 2a_1 x^1 = 0, 2a_2 x^2 = 0, 1 = 0 \end{cases}$$

Система не має розв'язків. Значить, на параболоїді F немає особливих точок. Це означає, що параболоїд F є регулярною неявно заданою поверхнею.

5) Рівняння $\Phi(\frac{x^1}{x^3}, \frac{x^2}{x^3}) = 0$ задає нам лінійчасту поверхню: якщо координати

якоїсь точки $P(p^1, p^2, p^3)$ задовольняють цьому рівнянню, то тому ж рівнянню будуть задовольняти і координати будь якої точки $Q(tp^1, tp^2, tp^3)$ прямої OP . Оскільки всі прямі проходять через точку O , поверхня F є конусом з вершиною в точці O . Саму точку O вважаємо виколотою, бо там $x^3=0$.

Проведемо горизонтальну площину $x^3=1$. Площина перетинає конус F по деякій кривій γ , що задається в цій площині рівнянням $\Phi(x^1, x^2) = 0$. Отже, конус F утворений прямими, що проходять через точку O і через точки кривої γ .



Перевіримо регулярність конуса.

Припустимо, що функція $\Phi(y^1, y^2) \in C^l$ -гладкою.

Запишемо систему рівнянь для знаходження особливих точок поверхні:

$$\begin{cases} \Phi\left(\frac{x^1}{x^3}, \frac{x^2}{x^3}\right) = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x^1} = 0, \frac{\partial \Phi}{\partial x^2} = 0, \frac{\partial \Phi}{\partial x^3} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \Phi\left(\frac{x^1}{x^3}, \frac{x^2}{x^3}\right) = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y^1} \frac{1}{x^3} = 0, \frac{\partial \Phi}{\partial y^2} \frac{1}{x^3} = 0, -\frac{\partial \Phi}{\partial y^1} \frac{x^1}{(x^3)^2} - \frac{\partial \Phi}{\partial y^2} \frac{x^2}{(x^3)^2} = 0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Phi(y^1, y^2) = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y^1} = 0, \frac{\partial \Phi}{\partial y^2} = 0 \end{cases}$$

Як наслідок, якщо неявно задана крива γ є регулярною, то конус F (з виколотою вершиною O) буде регулярною неявно заданою поверхнею. Якщо ж на кривій γ є особлива точка P_0 , то на конусі F отримаємо цілу пряму OP_0 , точки якої особливими точками конуса F . Інакше кажучи, пряма OP_0 буде представляти собою ребро на конусі F .



7) Рівняння $\Phi(\sqrt{(x^1)^2 + (x^2)^2}, x^3) = 0$ задає поверхню обертання F : якщо координати якоїсь точки $P(p^1, 0, p^3)$ задовольняють цьому рівнянню, то тому ж рівнянню будуть задовольняти і координати будь-якої точки $Q(p^1 \cos \varphi, p^1 \sin \varphi, p^3)$, отриманої з точки P обертанням навколо координатної вертикальної осі x^3 .

Рівняння $\Phi(x^1, x^3) = 0$ задає в координатній площині $x^1 x^3$ меридіан γ поверхні обертання F . Перевіримо регулярність поверхні F .

Припустимо, що функція $\Phi(r, x^3) \in C^1$ -гладкою.

Якщо меридіан γ перетинає вісь обертання, тобто, в якійсь точці $B(0, h)$ виконано $\Phi(0, h) = 0$, то функція $\Phi(\sqrt{(x^1)^2 + (x^2)^2}, x^3)$ може не бути неперервно диференційованою в точці $B(0, 0, h)$. Тобто в такій точці може порушуватись умова регулярності поверхні обертання.









Припустимо, що поверхня обертання F не містить точок на осі обертання, де $x^1=0, x^2=0$. Тоді функція $\Phi(\sqrt{(x^1)^2 + (x^2)^2}, x^3)$ буде C^l -гладкою*.

Запишемо систему рівнянь для знаходження особливих точок поверхні:

$$\begin{cases} \Phi(\sqrt{(x^1)^2 + (x^2)^2}, x^3) = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial r} \frac{x^1}{\sqrt{(x^1)^2 + (x^2)^2}} = 0, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial r} \frac{x^2}{\sqrt{(x^1)^2 + (x^2)^2}} = 0, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial x^3} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \Phi(r, x^3) = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial r} = 0, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial x^3} = 0 \end{cases}$$

Як наслідок, якщо неявно заданий меридіан γ є регулярною кривою, то і поверхня обертання F буде регулярною неявно заданою поверхнею. Якщо ж на меридіані γ є особлива точка P_0 , то на поверхні F маємо ціле коло особливих точок поверхні, отримане обертанням точки P_0 навколо осі x^3 . Інакше кажучи, таке коло буде представляти собою ребро на поверхні обертання F .




8) Функція $\Phi(x^1, x^2, x^3) = x^1 x^2 x^3 - a_0 \in C^\infty$ -гладкою.

Запишемо систему рівнянь для знаходження особливих точок поверхні:

$$\begin{cases} \Phi = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x^1} = 0, \frac{\partial \Phi}{\partial x^2} = 0, \frac{\partial \Phi}{\partial x^3} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^1 x^2 x^3 - a_0 = 0 \\ x^2 x^3 = 0, x^1 x^3 = 0, x^1 x^2 = 0 \end{cases}$$

Якщо $a_0 \neq 0$, то система не має розв'язків. Значить, на поверхні F немає особливих точок. Це означає, що поверхня F є регулярною неявно заданою поверхнею.

Якщо ж $a_0 = 0$, то система матиме розв'язок $x^1 = x^2 = 0$, або $x^1 = x^3 = 0$, або $x^2 = x^3 = 0$. То ж поверхня F міститиме три прямих, складених з особливих точок.




Задача 0.2.1. Розглянемо поверхню F в $\mathbb{R}^3$, задану параметрично

$$\begin{cases} x^1 = u^1 \\ x^2 = u^2 \\ x^3 = \sqrt{R^2 - (u^1)^2 - (u^2)^2} \end{cases}, \quad (u^1)^2 + (u^2)^2 < R^2$$


- 1) Якою є область задання D поверхні F ?
- 2) Покажіть, що F є частиною сфери радіуса R з центром в початку координат в $\mathbb{R}^3$. Яка саме це частина сфери?
- 3) Доведіть, що F є регулярною параметрично заданою поверхнею.
- 4) Проаналізуйте, які криві утворюють координатну сітку на поверхні F .

Розв'язання. Задана поверхня F представляє собою відкриту верхню півсферу

$$(x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2 = R^2, \quad x^3 > 0.$$



Область задання D поверхні F – це відкритий круг $(u^1)^2 + (u^2)^2 < R^2$ в площині параметрів u^1, u^2 .



Радіус-вектор поверхні F

$$\vec{f}(u^1, u^2) = \begin{pmatrix} u^1 \\ u^2 \\ \sqrt{R^2 - (u^1)^2 - (u^2)^2} \end{pmatrix}$$

є неперервно диференційованою вектор-функцією.

Обчислимо похідні вектор-функції $\vec{f}(u^1, u^2)$ і перевіримо виконання умови регулярності.

Маємо:

$$\frac{\partial \vec{f}}{\partial u^1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -u^1 \\ \sqrt{R^2 - (u^1)^2 - (u^2)^2} \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial \vec{f}}{\partial u^2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -u^2 \\ \sqrt{R^2 - (u^1)^2 - (u^2)^2} \end{pmatrix}$$


$$\left[\frac{\partial \vec{f}}{\partial u^1}, \frac{\partial \vec{f}}{\partial u^2} \right] = \begin{pmatrix} u^1 \\ \sqrt{R^2 - (u^1)^2 - (u^2)^2} \\ u^2 \\ \sqrt{R^2 - (u^1)^2 - (u^2)^2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Оскільки $\left[\frac{\partial \vec{f}}{\partial u^1}, \frac{\partial \vec{f}}{\partial u^2} \right] \neq \vec{0}$, робимо висновок, що F є регулярною параметрично заданою поверхнею.

Координатна лінія $\begin{cases} u^1 = c \\ u^2 = t \end{cases}$ на поверхні F задається в просторі $\mathbb{R}^3$ радіус-вектором

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} c \\ t \\ \sqrt{R^2 - c^2 - t^2} \end{pmatrix}$$


Вказана крива лежить в вертикальній площині Π : $x^1 = c$ і тому представляє собою вертикальне півколо – перетин півсфери F і площини Π .



Координатна лінія $\begin{cases} u^1 = t \\ u^2 = c \end{cases}$ на поверхні F задається, як крива в просторі $\mathbb{R}^3$, радіус-вектором


$$\vec{x} = \begin{pmatrix} t \\ c \\ \sqrt{R^2 - t^2 - c^2} \end{pmatrix}$$

Вказана крива лежить в вертикальній площині Π : $x^2 = c$ і тому представляє собою вертикальне півколо – перетин півсфери F і площини Π .



Отже, маємо координатну сітку на півсфері F , утворену з двох сімейств вертикальних півкіл.

Через кожну точку регулярно параметризованої поверхні F проходить по одній координатній кривій з кожного з двох сімейств координатних ліній:



Задачі для практичного заняття та самостійної роботи

Задача 10.0. Розглянемо поверхню S в $\mathbb{R}^3$, задану параметрично

$$\begin{cases} x^1 = R \cos v^1 \cos v^2 \\ x^2 = R \cos v^1 \sin v^2 \\ x^3 = R \sin v^1 \end{cases}, \quad -\frac{\pi}{2} < v^1 < \frac{\pi}{2}, \quad 0 < v^2 < 2\pi$$

- 1) Якою є область визначення $\hat{D}$ поверхні S ?
- 2) Покажіть, що S є частиною сфери радіуса R з центром в початку координат в $\mathbb{R}^3$. Яка саме це частина сфери?
- 3) Доведіть, що S є регулярною параметрично заданою поверхнею.
- 4) Проаналізуйте, які криві утворюють координатну сітку на поверхні S .

Задача 10.4. Розглянемо поверхні S і F із задач 10.0 і 0.2.1. Обидві поверхні представляють собою якісь області на сфері радіуса R з центром в початку координат в $\mathbb{R}^3$.

Проаналізуйте область W на сфері, що є перетином областей S і $\tilde{F}$.

В області W одночасно діють дві системи внутрішніх координат (v^1, v^2) і (u^1, u^2) .

Як пов'язані між собою ці системи координат в області W на сфері?

Чи є перехід від (v^1, v^2) до (u^1, u^2) регулярною заміною координат?